

WormerX (Format 20 g)

Traitement ciblé à large spectre contre les endoparasites (vers ronds intestinaux, nématodes et cestodes).

Présentation : WormerX™ est une formulation vétérinaire professionnelle hautement efficace, développée spécifiquement pour éliminer les parasites internes (endoparasites) qui colonisent le tractus gastro-intestinal des poissons d'ornement, en particulier des Discus, tout en préservant l'équilibre biologique de l'aquarium.

1. Quand utiliser WormerX ? (Indications)

WormerX doit être administré dès la manifestation de symptômes liés à une parasitose interne ou lors d'un protocole rigoureux de quarantaine :

- **Nématodes et vers ronds (Capillaria, Camallanus) :** Le poisson s'amincit de manière prononcée (dos en lame de couteau) malgré un appétit conservé au début, ou présente un refus total de s'alimenter dans les stades avancés.
- **Signes visibles :** Présence de petits vers rouges ou brunâtres qui dépassent parfois de l'anus du poisson (caractéristique des *Camallanus*).
- **Excréments anormaux :** Émission de selles blanchâtres, translucides ou filandreuses d'origine parasitaire.
- **Comportement :** Poissons craintifs, léthargiques, restant sombres ou isolés à l'arrière du bac.

2. Comment utiliser WormerX ? (Mode d'emploi)

Suivez rigoureusement le protocole afin d'assurer l'expulsion totale des vers et de rompre leur cycle de reproduction :

Étape 1 — Préparation : Effectuez un changement d'eau préalable. Retirez tout charbon actif, résines de filtration et éteignez les stérilisateurs UV.

Étape 2 — Dosage & Application : Dissolvez la dose requise dans un récipient d'eau tiède de l'aquarium, puis versez uniformément dans le bac.

Étape 3 — Oxygénation : Maintenez une aération maximale (pompe à air avec bulleur obligatoire) pendant toute la durée du traitement.

Étape 4 — Durée de l'action : Laissez le traitement agir dans l'eau conformément aux prescriptions. Les vers morts ou paralysés sont expulsés par les poissons et tombent sur le fond du bac.

Étape 5 — Nettoyage et Répétition : Effectuez un changement d'eau massif accompagné d'un siphonnage méticuleux du sol pour éliminer les vers expulsés et leurs œufs. ****Une seconde application est obligatoire après 10 à 14 jours**** pour éliminer les jeunes vers issus des œufs qui auraient éclos entre-temps.

3. Différence cruciale : WormerX vs FlukeX

Pour guider au mieux vos clients et éviter les erreurs de diagnostic sur votre boutique :

Produit	Cible principale	Symptômes majeurs
WormerX	Endoparasites (Vers internes) : Nématodes (Capillaria, Camallanus), vers ronds, vers plats intestinaux (Cestodes).	Amaigrissement malgré l'appétit, excréments blanchâtres filandreux, vers rouges visibles à l'anus.
FlukeX	Ectoparasites (Vers externes) : Douves des branchies (Dactylogyrus) et de la peau (Gyrodactylus).	Respiration accélérée, opercule fermé, frottements contre les décors, mouvements de tête.

4. Composition et Impact biologique

- **Ingrédients :** Formulation optimisée à base de Lévamisole (et agents synergiques propriétaires) garantissant une action systémique et une assimilation rapide.
- **Sécurité :** Totalement inoffensif pour les bactéries du filtre biologique et les plantes d'aquarium.

Précautions d'emploi : Conserver hors de portée des enfants. Destiné exclusivement aux poissons d'ornement. Ne pas surdoser. Certains invertébrés et escargots peuvent être sensibles : par précaution, les retirer du bac avant traitement. Conserver dans un endroit frais et sec. Veillez à utiliser une cuillère doseuse parfaitement sèche pour éviter l'altération de la poudre.

Fiche technique officielle destinée aux fiches produits de vente en ligne. Document généré pour DiscusX Europe.